



Herkistymisen aiheuttama ammattiastma

TOIMI NÄIN, KUN EPÄILET HERKISTYMISEN AIHEUTTAMAA AMMATTIASTMAA

Työpaikalla on *altistumista* hengitysteitä herkistäville aineille

- jauhopöly tai muu kasviperäinen pöly
- eläinperäinen pöly
- entsyymit
- herkistävät kemikaalit, esim. isosyanaatit, akrylaatit, epoksit tai hiusten kestäväväriaineet

JA



Työntekijällä esiintyy:

1) *astmaoireita, esim.*

- yskää
- hengenahdistusta
- hengityksen vinkunaa
- rasituksen siedon alenemista

tai

2) *Jokin muu syy* aiheuttaa epäilyn uudesta astmasta tai aiemman astman selvästä vaikeutumisesta.

SELVITÄ OIREIDEN YHTEYS TYÖHÖN

Spirometria ja
bronkodilaatiokoe

PEF-vrk
seuranta

PEF-työpaikkaseuranta
(www.ttl.fi/PEF)

Thorax-rtg
(crp, TVK, NSO-rtg)



ESIINTYYKÖ JOKIN SEURAAVISTA LÖYDÖKSISTÄ?

- A** Astmaoireet liittyvät työpäiviin.
- B** Todetaan nykyisessä työssä kehittynyt astma.
- C** Aiemmin vähäoireinen astma on selvästi pahentunut työssä.
- D** PEF-työpaikkaseurannassa havaitaan puhallusarvojen laskua työpäivinä.
- E** FEV1 on alentunut verrattuna aiempaan tutkimukseen (% viitearvosta -luku on pienentynyt vähintään 15 %)
- F** Spirometriassa ja PEF-vuorokausiseurannassa on viitteellisiä muutoksia astmalle.
- G** Työhön liittyvät nuhaoireet ja herkistyminen työ-altisteelle lisäävät ammattiastman todennäköisyyttä.



EI MIKÄÄN

**AMMATTIASTMAEPÄILY
EI VAHVISTU**

Seuranta

työterveyshuollossa



KYLLÄ

**AMMATTIASTMAEPÄILY
VAHVISTUU**

Lähetä

Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteeseen tai alueelliselle työlääketeen tai keuhkosairauksien poliklinikalle